

Ⅲ. 人工内耳手術の合併症(1)

ア. 味覚障害

出る方の方が少ないです。通常、半年くらいで戻ります。

イ. 顔面神経麻痺

滅多にありません。徐々に改善し麻痺が残ることは稀です。

ウ. めまい

1～3割で一時的なめまいが起こることがありますが、通常は徐々に良くなります。

Ⅲ. 人工内耳手術の合併症(2)

エ. 痛み

大抵の方は、あまり痛くないようです。通常は飲み薬の痛み止めで大丈夫です。しかし、痛みの出方は人によって違うので、そのたびに対応します。

オ. 術後感染

手術後は抗生物質の点滴や内服を行いますので、ほとんどありません。発症した場合は的確な処置と投薬を行います。

Ⅲ. 人工内耳手術の合併症(3)


味覚障害? 顔面神経麻痺? めまいが起こる?

ア. 顔面神経と鼓索神経(味覚)の間の

狭いところの骨を削り、
セイエンソウ

イ. 蝸牛の入り口(正円窓)に穴を開けて 電極を入れます。

ウ. 前庭(平衡機能)は蝸牛と繋がって います。



Ⅳ. 手術後の状態

ア. めまいがある方以外は、帰室後3時間で自分の足で歩けます。その日のうちに食事もできます。

イ. 頭に包帯を巻かれていますが、翌日の診察で耳の周りだけになります。退院の時は包帯はありません。

ウ. 翌日からシャワーを浴びることができます。髪も洗えます。

エ. 通常、手術後3日(合計5日間)で退院になります。

オ. 注意! 手術してもすぐに聞こえるわけではありません。音入れは入院中または退院後約1～2週間後です。

カ. 通常、仕事や家事は翌日からすぐにできます。激しい運動は1ヶ月ほど控えていただきます。